

โรคพิษสุนัขบ้า

อันตราย! แต่ป้องกันได้

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือโรคคอกลิ้นน้ำ เป็นโรคติดเชื้อในระบบประสาท จากสัตว์สู่คน เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าไม่พบแค่สุนัขเท่านั้น แต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น สุนัข แมว วัว ลิง หนู กระต่าย เป็นต้น

ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มี ยารักษา แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน

อาการหลังจากติดเชื้อพิษสุนัขบ้า

- ระยะที่ 1**
มีไข้ เบื่ออาหาร
- ระยะที่ 2**
มีอาการที่ทางประสาท คลุ้มคลั่ง
- ระยะที่ 3**
ภาวะหายใจล้มเหลว หัวใจหยุดเต้น โคม่า และเสียชีวิต

3 ขั้นตอนการป้องกันการติดเชื้อ

- พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- หลีกเลี่ยงไม่ให้ ถูกสัตว์กัด ทำร้าย
- หลังโดนกัด รีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อฉีดวัคซีนป้องกัน

กองสาธารณสุขท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กลุ่มเสี่ยง



อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี



ถูกกัด ข่วน แล้วไม่ไปฉีดวัคซีน

การติดต่อ

ถูกสัตว์มีเชื้อ



อาการผู้ป่วย

เบื่ออาหารเจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย



กลัวลม กลืนลำบากกลัวน้ำ

คันรุนแรง บริเวณที่เคยถูกกัด อัมพาตตาย

ตัวอย่างไวรัสตัวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ระยะแรก

- นิสัยเปลี่ยน ไร้ราเรื่อ
- หงุดหงิด เกือบตัว
- หวาดระแวง น่านตามนุษย์

ระยะตื่นเต้น

- กระวนกระวาย
- กัดไม่เลือก
- ทำคอน

ระยะอัมพาต

- น้ำลายไหล
- คาหอยคต
- สับอ้อ ตาย

เกิดจากเชื้อ เรบีส์ไวรัส (RABIES VIRUS) มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว วัว ควาย ลิง หมู หนู กระต่าย กระจอก ฯลฯ เป็นพาหะนำโรค ผู้ติดเชื้อจนมีอาการ ตาย ๑๐๐%


คำแนะนำเมื่อถูกกัด - ข่วน-เลีย



ล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาด หลาย ๆ ครั้ง



ใส่ยา เบตาดีน



กักหมา - แมว เพื่อสังเกตอาการ ๑๐ วัน



หาหมอหากฉีดวัคซีนต้อง มาตามนัดทุกครั้ง

คำแนะนำสำหรับผู้เลี้ยง



ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี



ออกนอกบ้านต้องใส่สายจูง



ฝึกให้ เชื่อฟังคำสั่ง



ทำหมัน คุมกำเนิด

อย่าเหยียบ

คาถา ๕ ย กันสุนัขกัด



ทำให้สุนัขโกรธ

อย่าเหยียบ

หาง หัว ตัว ขา ให้สุนัขตกใจ



อย่าแยก

สุนัขที่กัดกันด้วยมือ เปลา



อย่าหยิบ

อาหารที่สุนัขกำลังกิน



อย่ายุ่ง

กับสุนัขที่ไม่รู้จัก หรือไม่มีเจ้าของ



กลุ่มงานป้องกันโรค กองสาธารณสุขท้องถิ่น