



อย่ารอให้ป่วย แล้วค่อยป้องกัน โรคคางทูม

อาการที่ควรไปพบแพทย์

แกำบวม



มีไข้

สงสัยโรคคางทูม ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย

3 พื้นที่เสี่ยงสูง



สถานศึกษา



ค่ายทหาร



เรือนจำ

มาตรการเมื่อพบผู้ป่วย



รายงานเข้าสู่ระบบ



แยกกักผู้ป่วยอย่างน้อย 5 วัน



ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด 25 วัน

ประชาชนร่วมป้องกันได้



สวมหน้ากากอนามัย
เมื่อมีอาการป่วย



ล้างมือสม่ำเสมอ



หลีกเลี่ยง การใช้
ของส่วนตัวร่วมกัน



งด กิจกรรมรวมกลุ่ม
เมื่อมีอาการสงสัยโรค

วัคซีน MMR 2 เข็ม ป้องกันได้ถึง 86%



หมายเหตุ : ภูมิคุ้มกันอาจลดลงตามระยะเวลา

เด็กควรได้รับวัคซีนเข็มแรกตอนอายุ 9 เดือน และเข็มที่สองตอนอายุ 1 ปี 6 เดือน

*** สำหรับผู้ใหญ่ การได้รับวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) สามารถจัดหาวัคซีนได้โดยมีค่าใช้จ่าย โดยติดต่อขอรับบริการที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ที่มา : กองโรคติดต่อทั่วไป



สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

